Bilan de l'utilisation des antibiotiques en maternité

# PorcTRACÉ :	Site :	Vétérinaire :
Date :		

Indiquer à l'aide d'une croix le résultat de ce site sur les graphiques.

Usage des antibiotiques injectables (cat. 1) (nombre de jours types de traitement)

Éleveurs non utilisateurs : 29 %

Éleveurs utilisateurs : 71 %

50 % sites < 0,8

0,8 ≤ 25 % sites < 6,9

6,9 ≤ 25 % sites



Usage des antibiotiques dans l'eau (nombre de jours types de traitement)

Éleveurs non utilisateurs : 68 %

Éleveurs utilisateurs : 32 %

75 % sites < 21

21 ≤ 15 % sites < 41,3

41,3 ≤ 10 % sites



Usage des antibiotiques injectables (cat. 2 et 3) (nombre de jours types de traitement)

Éleveurs non utilisateurs : 0 %

Éleveurs utilisateurs : 100 %

50 % sites < 10

10 ≤ 25 % sites < 23

23 ≤ 10 % sites



Les traitements par injection de routine ne sont pas souhaitables et doivent être réévalués.

Plan de réduction

Maternité	Moulée		Hydrosolubles		Injectables			
	Diminution	Arrêt	Diminution	Arrêt	Diminution		Arrêt	
Truies inséminées								
Truies à la mise-bas								
Truies fouillées								
Truies qui ne mangent pas								
Truie en gestation								
Truie en lactation								
Porcelets sous la mère					Naissance		Naissance	
					Castration		Castration	
					Sevrage		Sevrage	
Autre								