

# La première paissance à la mi-mai ou au début de juin?

par France Bélanger, agronome, M. Sc.

Direction régionale de la Chaudière-Appalaches

Sortir les vaches en même temps que la tondeuse à gazon : ce que cela implique	Sortir les vaches au début des foins : ce que cela implique
Période : mi-mai	Période : début juin
Planification selon la croissance de la parcelle <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous avez une parcelle en dactyle, choisissez-la comme première paissance, comme elle est très hâtive</li> <li>• Sinon, commencez par les parcelles les plus vieilles comportant des plantes peu productives, mais qui ont une bonne portance</li> </ul>	Pâturage possible dans toutes les parcelles (à cette période, l'herbe est déjà dense. Elle a plus de 20 cm de hauteur et sa croissance est rapide)
Herbe encore courte, ce qui permet aux vaches de s'adapter à la nouvelle alimentation, ne pas trop en manger et de faciliter la transition en leur donnant du foin sec à volonté pour combler les besoins alimentaires.	Nécessité d'alimenter les vaches uniquement avec des balles de foin, deux semaines de plus à l'intérieur.  Herbe abondante au pâturage, ce qui ne permet pas de transition en termes d'alimentation (changement radical)
Risque de terrain trop mou (printemps) et il faut donc choisir la parcelle avec la meilleure portance (plantes basses et sol plus sableux-graveleux et bien drainée)	Risque de terrain trop mou s'il y a eu de la pluie
Première parcelle broutée rapidement	Comme l'herbe est très abondante dans la première parcelle, les vaches y pâturent trois fois plus longtemps (herbe très abondante)
Parcelle bien broutée et peu de refus à la sortie des vaches	Beaucoup de refus, ce qui génère une perte de rendement
Possibilité de faucher le tiers des parcelles pour une production de foin de qualité au début de juin	Diminution rapide de la qualité des fourrages, à partir de la mi-juin, si les parcelles en surplus ne sont pas fauchées
Repousse plus dense à la deuxième rotation de paissance	Repousse plus lente à la deuxième rotation de paissance
Retour à la première parcelle broutée entre le 5 et le 10 juin	Retour à la première parcelle à la fin de juin (attente de la repousse)
Pas de fauche nécessaire pour les refus	Fauche des refus pour la moitié des parcelles
Hauteur adéquate des autres paissances (autour de 20 cm)	Paissances suivantes : les vaches broutent en hauteur à cause de l'odeur de décomposition des refus qu'il soient fauchés ou pas
Parcelles moins affectées par la sécheresse car plus de feuillage produit près du sol, ce qui diminue l'évapotranspiration.	Parcelles plus sensibles à la sécheresse parce qu'il y a eu formation de tiges, comme dans les prairies fauchées.
Plus de rendement fourrager des parcelles par hectare	Moins de rendement fourrager des parcelles par hectare
Plus économique (moins de foin à entreposer)	Foin de plus à entreposer : coût de production plus élevé que les pâturages
Moins de litière à produire annuellement puisque les animaux sont dehors deux semaines de plus au printemps et au moins un mois de plus à l'automne	Plus grande quantité de litière à entreposer puisque les animaux sont à l'intérieur deux semaines de plus au printemps et un mois de plus à l'automne.
Meilleur taux de gain des veaux (herbe toujours jeune et de qualité)	Fluctuation de la production de lait, ce qui implique la baisse du taux de gain des veaux (surtout s'il faut arrêter la paissance en mi-saison en raison d'un manque de parcelles en production et donner un autre type de foin)